

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第1類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	プリズマホルモン軟膏
2	成分・分量	1g中 「局外規」テストステロン…………… 10mg 添加物:親水ワセリン、エタノール
3	用法・用量	表皮の薄い部分や ^{その} 其他の患部 ^{注)} をきれいにし、1回約0.1g(小豆大)を1日1~2回、手にとつてすりこんで下さい。 注)その他の患部:亀頭部、陰囊(睾丸)など
4	効能・効果	男性ホルモン分泌不足による神経衰弱諸症、男性更年期諸症、男性老衰現象の予防及び恢復(恢復)、恥部無毛症
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないで下さい。</p> (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)ご使用前に本剤をチューブから5mm程度出し、内股などの皮膚のうすい所にすり込んで、翌日中に発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれなどの症状があらわれた人 (3)アンドロゲン依存性悪性腫瘍[例えば前立腺腫瘍、乳腫瘍(悪性)]及びその疑いのある人 (4)女性 (5)15歳未満の小児 (6)排尿困難を伴う前立腺肥大のある人 (7)前立腺検査※の結果、前立腺特異抗原(PSA)の値が2.0ng/mL以上の人(医師の判断に従って下さい)。※有効成分(テストステロン)は前立腺腫瘍を進行させるおそれがあります a)特に50歳以上の男性は前立腺腫瘍の罹患率が高まるため、本剤のご使用前に前立腺検査を受ける必要があります b)継続的にご使用の人は定期的な検査を受ける必要があります c)検査の結果、異常があった場合には直ちに本剤のご使用を中止して、医師又は薬剤師に相談して下さい (8)睡眠時無呼吸症候群である人 <p>2. 次の部位には使用しないで下さい。</p> (1)目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔等) (2)陰茎部先端(尿道口) (3)外傷、炎症、湿疹、ただれ、化膿などのある部位 <p>3. 本剤を使用している間は、男性ホルモンを含んだいずれの医薬品も使用しないで下さい</p> <p>4. 使用者以外へ付着させないで下さい</p> (1)ご使用後は石鹸とぬるま湯で手を十分に洗って下さい。(2)本剤を使用者以外の人に付着させないように注意して下さい。付着した場合は直ちに洗い流して下さい。(3)塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹸とぬるま湯で十分に洗い流して下さい。 <p>次に該当する人はお申し出下さい</p> (1) 医師の治療を受けている人 (2) 前立腺肥大症ではあるが、排尿困難を伴わない人 (3) 薬や化粧品などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ等)を起こしたことがある人 (4) 重度の心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧またはその既往歴のある人。
6	薬剤師が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。