

開け口

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。  
また、必要時に読めるように保管しておいて下さい。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の診断を受けた人は服用しないで下さい：心臓病
2. 症状があるときのみ服用にとどめ、連用しないで下さい

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 次の症状のある人：むくみ。(5) 次の診断を受けた人：高血圧、腎臓病。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診断を受けて下さい

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

製造番号

使用期限

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本品に関する問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせ下さい。

原沢製薬工業株式会社 お客様相談室  
電話 (03) 3441-5191  
受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売  原沢製薬工業株式会社  
東京都港区高輪3丁目19番17号



副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

MADE IN JAPAN



飲みやすいゼリータイプ

足がつる  
こむらがりえりに

ツランZゼリー



スティック  
ゼリー

4包入

第2類医薬品

効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激な伸びを伴う痛みのあるものの次の諸症：こむらがりえり、筋肉のけいれん、腰痛、腰痛

用法・用量

次の量を1日3回、食前又は食間に口の中でゼリーをくずして服用して下さい。  
成人(15歳以上)：1回1包  
※15歳未満は服用しないで下さい。※定められた用法・用量を守って下さい。

服用方法

- ① 黄色い三角マークの切れ目にそって開封して下さい  
開封時には中身の飛び出しにご注意下さい
- ② 切り口をくわえ、指でしぼり出すように服用して下さい  
※切り口部分で唇を切らないようにご注意ください

成分・分量

1日量3包(30g)中、次の成分を含む。  
芍薬甘草湯エキス……………2.4g  
(シヤクヤク、カンゾウ各6gより抽出)  
添加物：カンテン末、キサンタンガム、マクロゴール、エリスリトール、果糖ブドウ糖液糖、グリセリン、スクラロース、アセシルアムカリウム、アスパルテーム、エタノール、パラベン、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、香料